

Отделение лингвистики, 2014-15 СТСЛЬ. РҮР «РҮ**Математика — 4****z-тест (29 сентября 2014)***И. В. Щуров, Р. Я. Будылин*

Задача 1. Исследователь считает, что полученные им данные соответствуют случайной выборке из некоторой генеральной совокупности. Нулевая гипотеза гласит, что среднее по генеральной совокупности составляет 100. Альтернатива — что среднее больше 100. Выборочное среднее составило 107.3, стандартное отклонение составляет 22.1. Следует ли отвергнуть нулевую гипотезу? Объяснить, что означает полученное значение p -value? Является ли оно вероятностью того, что нулевая гипотеза верна?

Задача 2. С целью уменьшения количества прогулов, компания вводит режим плавающего графика. В прошлом (до ввода нового режима), каждый сотрудник прогуливал (отпрашивался, опаздывал и т.д.) в среднем 6.3 дня в год. Стандартное отклонение составляло 2.9 дней. После ввода нового режима проходит год и менеджмент пытается подвести итоги и понять, достигнута ли заявленная цель. Для этого случайно выбирается 100 сотрудников и запрашиваются данные по их прогулам. Выясняется, что среднее число прогулов снизилось до 5.5 дней, стандартное отклонение считаем неизменным. Можно ли на основании этих данных утверждать, что свободный график действительно поспособствовал уменьшению числа прогулов или полученный результат объясняется случайностью? Считаем, что рассматриваемый год ничем не отличается от предыдущих (нет других факторов, которые бы влияли на прогулы — например, неверно, что в этом году в среднем была более благоприятная для прогулов погода или экономическая ситуация). Сформулировать соответствующую нулевую гипотезу и альтернативу и применить адекватный статистический тест.

Задача 3. Решить задачу 2 в предположении, что исследуемая выборка состояла лишь из одного человека.

Задача 4. Решить задачу 2 в предположении, что стандартное отклонение составляло 29 дней.

Задача 5. Решить задачу 2 в предположении, что полученное после введения свободного графика среднее составляет 5.9 дней.