

**Совместный бакалавриат ВШЭ–РЭШ, 2014/15 уч. год****Дифференциальные уравнения****Семинар. Линейные уравнения (6 февраля 2020 г.)***И. А. Хованская, И. В. Щуров, Д. А. Филимонов***Задача 1.** Решите следующие уравнения:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad y = x(y' - x \cos x); & \text{(c)} \quad 2x(x^2 + y)dx = dy; & \text{(e)} \quad (2e^y - x)y' = 1; \\ \text{(b)} \quad xy' + (x+1)y = 3x^2e^{-x}; & \text{(d)} \quad (x+y^2)dy = ydx; & \text{(f)} \quad y' = \frac{y}{3x-y^2}. \end{array}$$

**Задача 2.** Пусть  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  — два каких-то различных решения неоднородного линейного дифференциального уравнения первого порядка. Выразить через них решение того же уравнения с начальным условием  $x(t_0) = x_0$  для произвольных  $t_0, x_0$ .**Задача 3.** Пусть  $x = \varphi(t; x_0)$  — решение уравнения с начальным условием  $x(0) = x_0$ . Найти  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}$  при  $x_0 = 0$ . Как ведут себя интегральные кривые, близкие к  $x \equiv 0$ , когда начальное условие немного отклоняется от 0, при  $t \rightarrow +\infty$ ?

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \dot{x} = 2x; & \text{(f)} \quad \dot{x} = t \sin x; \\ \text{(b)} \quad \dot{x} = \sin x; & \text{(g)} \quad \dot{x} = \sin x \sin t; \\ \text{(c)} \quad \dot{x} = xt; & \text{(h)} \quad \dot{x} = (x+x^2)t; \\ \text{(d)} \quad \dot{x} = -xt; & \text{(i)} \quad \dot{x} = x \sin(x+t); \\ \text{(e)} \quad \dot{x} = x \sin t; & \text{(j)} \quad \dot{x} = x^2(t+x). \end{array}$$