

Совместный бакалавриат ВШЭ–РЭШ, 2016/17 уч. год
Дифференциальные уравнения (<http://math-info.hse.ru/s16/f>)
Семинар 16. Устойчивость (26.05.2017)
И. В. Щуров, Н. А. Солодовников

Определение 1. Рассмотрим автономное дифференциальное уравнение $\dot{x} = v(x)$. Пусть x_* — его положение равновесия, то есть $v(x_*) = 0$. Тогда x_* называется *устойчивым по Ляпунову* если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $\delta > 0$, что для любого решения x с начальным условием $x(0) \in U_\delta(x_*)$ для всех $t \geq 0$ решение $x(t)$ лежит в $U_\varepsilon(x_*)$.

Определение 2. Положение равновесия x_* называется *асимптотически устойчивым*, если оно устойчиво по Ляпунову и существует такая окрестность $U \ni x_*$, что для всякого решения x с начальным условием $x(0) \in U$ справедливо утверждение: $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = x_*$.

Задача 1. [1] Исследовать устойчивость положений равновесия следующих уравнений и систем: определить, являются ли они устойчивыми по Ляпунову, асимптотически устойчивыми?

- | | |
|---|---|
| (a) $\dot{x} = 0;$ | (e) $\begin{cases} \dot{x} = y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \dot{y} = -x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases}$ |
| (b) $\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = y;$ | |
| (c) $\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x;$ | (f) $\begin{cases} \dot{x} = y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2) \end{cases}$ |
| (d) $\dot{x} = x^2 \quad \dot{y} = -y;$ | |

Задача 2. Рассмотрим дифференциальное уравнение, в полярных координатах задающееся следующим образом:

$$\dot{\varphi} = \sin(\varphi) + 1, \quad \dot{r} = r(1 - r).$$

- (a) Построить фазовый портрет в координатах (r, φ) и (x, y) .
- (b) Что можно сказать о поведении решений при $t \rightarrow +\infty$?
- (c) Является ли положение равновесия $(r = 1, \varphi = -\pi/2)$ асимптотически устойчивым?
- (d) Устойчивым по Ляпунову?

Задача 3. [2] Используя теорему об устойчивости по первому приближению, исследовать, при каких значениях параметров a и b асимптотически устойчиво нулевое решение. При каких оно является неустойчивым по Ляпунову? При каких теорема не даёт ответ на вопрос об устойчивости?

- | | | |
|---|---|---|
| (a) $\begin{cases} \dot{x} = ax - 2y + x^2 \\ \dot{y} = x + y + xy \end{cases}$ | (b) $\begin{cases} \dot{x} = y + \sin x \\ \dot{y} = ax + by \end{cases}$ | (c) $\begin{cases} \dot{x} = ax + 2y \\ \dot{y} = -5x - 3y \end{cases}$ |
|---|---|---|

Задача 4. Известно, что существует решение $x(t) \in \mathbb{R}^n$ дифференциального уравнения $\dot{x} = v(x)$, такое что $x(0) \neq 0$ и $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 0$. Что можно сказать об устойчивости положения равновесия $x = 0$?

Список литературы

- [1] Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Ижевск: Ижевская республиканская типография. 2000. — 368 с.
- [2] Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальных уравнениям. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.