

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019-20 уч. год**Дифференциальные уравнения** (<http://math-info.hse.ru/s19/g>)**Семинар 5. Автономные и неавтономные уравнения, дифференциальные формы (14.02.2020)**

И. Щуров, М. Матушко

Задача 1. Рассмотрим модель Лотки–Вольтерра, описывающую динамику популяции хищников (y) и их жертв (x):

$$\dot{x} = kx - axy, \quad \dot{y} = -ly + bxy. \quad (1)$$

Здесь a, b, k, l — положительные параметры, $x \geq 0, y \geq 0$.

- Найти все особые точки векторного поля, соответствующего уравнению (1).
- Нарисовать векторное поле (1).
- Нарисовать эскиз фазовых кривых. Проинтерпретировать их вид в терминах исходной модели.
- Записать неавтономное дифференциальное уравнение, интегральные кривые которого совпадают с фазовыми кривыми системы (1).
- Решить полученное уравнение.
- Нарисовать фазовые кривые системы (1).
- Проинтерпретировать полученные результаты в терминах исходной модели.

Определение 1. Дифференциальной 1-формой называется функция $\omega: U \times V_n \rightarrow \mathbb{R}$ от двух аргументов: точки P из области U в n -мерном пространстве \mathbb{R}^n и вектора v из n -мерного линейного пространства V_n . Функция ω должна быть линейной по второму аргументу.

Другой способ думать о дифференциальной 1-форме: это *ковекторное поле*, то есть отображение, ставящее в соответствие каждой точке $P \in U \subset \mathbb{R}^n$ некоторый линейный функционал на векторном пространстве V_n .

Задача 2. Пусть $P = (x, y) \in \mathbb{R}^n$ и $v = (v_x, v_y) \in V_2$. Какие из следующих функций являются 1-формами?

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (a) $\omega(P, v) = x + y;$ | (c) $\omega(P, v) = v_x + v_y + 1;$ | (e) $\omega(P, v) = x^2v_x + y^2v_y;$ |
| (b) $\omega(P, v) = v_x;$ | (d) $\omega(P, v) = x y v_x;$ | (f) $\omega(P, v) = x v_x v_y.$ |

Замечание 1. Множество ковекторов образует линейное пространство. В качестве его базиса можно выбрать «координатные функционалы». Например, для вектора $v = (v_x, v_y) \in V_2$ можно определить функционалы $dx(v) = v_x$ и $dy(v) = v_y$. Они являются базисом в пространстве линейных функционалов на двумерном векторном пространстве. Теперь 1-форму

$$\omega(P, v) = x^2v_x + y^2v_y$$

можно записать в виде

$$\omega(x, y) = x^2dx + y^2dy$$

Замечание 2. С дифференциальным уравнением вида $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$ можно связать дифференциальную форму

$$\omega = f(x, y)dx - g(x, y)dy,$$

где $dx(v) = v_x, dy(v) = v_y$ — соответствующие базисные функционалы.

Задача 3. Найти форму, соответствующую уравнению, и построить её поле направлений. Сравнить с полем направлений для исходного уравнения.

- | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| (a) $y' = y;$ | (b) $y' = y/x;$ | (c) $y' = -y/x;$ | (d) $y' = -x/y.$ |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|

Определение 2. Дифференциалом функции $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется дифференциальная 1-форма df , обладающая следующим свойством: для любой точки x из области определения f и любого вектора v с маленькой нормой справедливо соотношение

$$f(x + v) = f(x) + df(x)(v) + o(\|v\|).$$

Задача 4. Для следующих функций f найти их дифференциалы и найти поля направлений для уравнения $df = 0$. Построить несколько линий уровня функции f .

(a) $f(x, y) = x;$

(b) $f(x, y) = 2x + 3y;$

(c) $f(x, y) = x^2 + 4y^2;$

(d) $f(x, y) = x^2 - y^2;$

(e) $f(x, y) = xy;$

(f) $f(x, y) = x - \sin y;$

(g) $f(x, y) = x^2y^2;$

(h) (*) $f(x, y) = y^2/2 + \sin x.$