

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019-20 уч. год
Дифференциальные уравнения (<http://math-info.hse.ru/s19/g>)
Семинар 15. Нелинейные системы и устойчивость (8.05)
И. Щуров, М. Матушко

Определение 1. Дифференциальные уравнения $\dot{x} = v(x)$ и $\dot{y} = w(y)$ называются *орбитально топологически эквивалентными* если существует такая непрерывная замена координат (гомеоморфизм: обратимое непрерывное отображение, для которого обратное также непрерывно), которая переводит фазовые кривые одного уравнения в фазовые кривые другого уравнения с сохранением направления движения.

Задача 1. Доказать, что уравнения $\dot{x} = x^2 - 1$ и $\dot{y} = y^2 - 4$ орбитально топологически эквивалентны.

Задача 2. Являются ли орбитально топологически эквивалентными уравнения $\dot{x} = x + x^3$ и $\dot{x} = x - x^3$?

Задача 3. Найти замену координат, которая переводит фазовый портрет уравнения

$$\dot{x} = -x + y \quad \dot{y} = -x - y$$

в фазовый портрет уравнения

$$\dot{x} = -x \quad \dot{y} = -y.$$

Задача 4. Пусть уравнения $\dot{x} = v(x)$ и $\dot{y} = \tilde{v}(y)$ орбитально топологически эквивалентны. Пусть x_* — особая точка первого уравнения, устойчивая по Ляпунову. Что вы можете сказать про устойчивость точки $y_* = h(x_*)$ для второго уравнения, где h — гомеоморфизм, осуществляющий эквивалентность?

Определение 2. Дифференциальное уравнение $\dot{x} = v(x)$ называется *структурно устойчивым*, если оно орбитально топологически эквивалентно своему C^1 -малому возмущению. Иными словами, существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для всякого w , такого, что $\|w(x)\| < \varepsilon_0$ и $\|\partial w / \partial x\| < \varepsilon_0$, дифференциальное уравнение $\dot{x} = v(x) + w(x)$ орбитально топологически эквивалентно исходному уравнению.

Задача 5. Доказать, пользуясь определением, что уравнение $\dot{x} = x^3$ не является структурно устойчивым.

Задача 6. Рассмотрим семейство уравнений на плоскости

$$\dot{x} = c - x^2, \quad \dot{y} = -y$$

Построить фазовые портреты при $c < 0$, $c = 0$, $c > 0$. Что происходит при прохождении параметром c значения 0? При каких значениях c уравнение является структурно устойчивым, а при каких не является? (Из этой задачи должно быть понятно, почему бифуркацию, обсуждавшуюся на лекции, называют седло-узловой.)

Задача 7. Докажите строго, что гомеоморфизм переводит замкнутые кривые в замкнутые кривые.

Задача 8. Докажите, что система, единственная особая точка которой является асимптотически устойчивой, не может быть орбитально топологически эквивалентной системе, единственная особая точка которой асимптотически неустойчива.

Задача 9. Пусть у дифференциального уравнения с особой точкой x_* существует траектория, которая стремится к x_* в прямом времени (то есть $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = x_*$ для какого-то решения $x = x(t)$) и существует траектория, которая стремится к x_* в обратном времени (то есть $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = x_*$ для какого-то (быть может, другого) решения $x = x(t)$). Может ли такая система быть структурно устойчивой, если размерность фазового пространства

- (a) равна 1?
- (b) (*) больше 1?