

**Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2021-22 уч. год****Математический анализ 1** (<http://math-info.hse.ru/s21/3>)**Семинар 1 (1 сентября 2021)***И. Щуров, В. Болбачан, М. Бекетов, А. Трофимова, И. Эрлих*

Знаком ( $\hat{\square}$ ) отмечены задачи или пункты для самостоятельного решения. Их не планируется обсуждать на семинаре, но они могут быть включены в самостоятельную работу наравне с остальными задачами.

**Задача 1.** Рассмотрим отображение  $f: \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 5\}$ , заданное следующим образом:

$x$	$f(x)$
a	2
b	1
c	2
d	5

Является ли оно

- (a) инъективным;                      (b) сюръективным;                      (c) биективным?

**Задача 2.** Рассмотрим отображение  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , заданное следующим образом:  $f(x) = x^2$ . Является ли оно

- (a) инъективным;                      (b) сюръективным;                      (c) биективным?

**Задача 3.** ( $\hat{\square}$ ) Рассмотрим отображение  $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , заданное следующим образом:  $f(x) = x^2$ . Является ли оно

- (a) инъективным;                      (b) сюръективным;                      (c) биективным?

**Задача 4.** (\*) Докажите, что если существует инъективное отображение  $f: X \rightarrow Y$  и инъективное отображение  $g: Y \rightarrow X$ , то существует биективное отображение  $h: X \rightarrow Y$ .

**Задача 5.** Доказать, что квадратный корень из любого простого числа иррационален.

**Задача 6.** Может ли

- (a) сумма двух рациональных чисел быть иррациональным числом?  
(b) ( $\hat{\square}$ ) сумма рационального и иррационального — рациональным?  
(c) сумма двух иррациональных чисел — рациональным числом?  
(d) ( $\hat{\square}$ ) произведение двух иррациональных чисел — рациональным числом?

**Задача 7.** Доказать, что рациональные числа всюду плотны, то есть для любого интервала  $(a; b)$ ,  $b > a$ , существует бесконечное количество рациональных чисел, принадлежащих этому интервалу.

**Задача 8.** (♠) Доказать, что число  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  является иррациональным.

**Задача 9.** Доказать, что любое рациональное число задается бесконечной периодической десятичной дробью (быть может, с периодом (0)).

**Задача 10.** Доказать, что иррациональные числа тоже всюду плотны.

**Задача 11.** Чему равняется  $1 - 0,(9)$ ?

**Задача 12.** Доказать, что любая бесконечная периодическая десятичная дробь задает рациональное число.

**Задача 13.** Представьте, что вы — древний грек. Что вы можете сказать о числе  $\pi$ ? Как доказать, используя только геометрические рассуждения, что  $\pi > 3$ ? Что  $\pi < 4$ ? Можете ли вы доказать более точные оценки?

**Задача 14.** Пусть  $a$  и  $b$  — целые числа и  $a = bq + r$ , где  $q$  и  $r$  тоже целые числа. Докажите, что в этом случае  $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, r)$ .

**Задача 15.** (Алгоритм Евклида) Пусть  $a$  и  $b$  — целые числа, не равные одновременно нулю, и последовательность чисел

$$a > b > r_1 > r_2 > r_3 > r_4 > \dots r_{n-1} > r_n > r_{n+1} = 0,$$

определена следующим образом: каждое  $r_k$  — это остаток от деления предыдущего числа на предыдущее, а  $r_{n-1}$  делится на  $r_n$  нацело.

Докажите, что  $\text{НОД}(a, b) = r_n$

**Задача 16.** Найти наибольший общий делитель (НОД) для чисел

(a) 6 и 15.

(b) 228 и 60.

(c) (♠) 312 и 22

**Задача 17.** Покрыть прямоугольник

(a)  $6 \times 15$

(b)  $228 \times 60$

(c) (♠)  $312 \times 22$

одинаковыми квадратами с максимально возможной стороной.

**Задача 18.** (\*) С помощью алгоритма Евклида доказать, что для любых натуральных чисел  $m$  и  $n$  найдутся такие целые числа  $s$  и  $t$ , что  $sm + tn = \text{НОД}(m, n)$ . Однозначным ли образом они определены?

**Задача 19.** С помощью предыдущей задачи доказать утверждение: если  $p$  и  $q$  взаимно просты, и при этом  $np$  делится на  $q$ , то  $n$  делится на  $q$ . (Все числа — целые.)

**Задача 20.** С помощью предыдущей задачи доказать единственность представления рационального числа в виде несократимой дроби. Иными словами, если  $m/n = p/q$  и при этом  $m$  и  $n$  взаимно просты и  $p$  и  $q$  взаимно просты, то  $m = p$  и  $n = q$ .