

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019—20 уч. год

Линейная алгебра

Домашнее задание №8

И. Щуров, М. Матушко, И. Машанова, И. Эрлих

Фамилия и имя студента: Савельева Алина Анатольевна

Правила

Academic ethics policy. Попытка сдать хотя бы частично списанный текст будет рассматриваться как грубое нарушение принципов академической этики со всеми административными и репутационными последствиями.

Deadline policy. Срок сдачи работы указан в тью.NES и не будет переноситься. В случае сдачи работы после срока оценка умножается на e^{-t} , где t — число дней, прошедших с дедлайна (вещественное число, не округляется).

Typography policy. Текст работы сдаётся исключительно в формате PDF. Работа с идеальным оформлением, набранная на компьютере, выглядящая как страница из хорошо свёрстанной книги, получает бонус в 5% от числа набранных баллов. Работа с плохим оформлением (например, скан работы, написанной от руки), получает штраф в 5% от числа набранных баллов. Работа, чтение которой вызывает существенные затруднения (неразборчивый скан или фотография и т.д.), может быть возвращена на доработку без продления дедлайна.

Задачи

Задача 1. Найти все собственные значения и собственные векторы линейного оператора, заданного матрицей A . Найти алгебраические и геометрические кратности каждого собственного значения. Найти, если это возможно, такую невырожденную матрицу C , что $A = CDC^{-1}$, где D — диагональная матрица (все внедиагональные элементы равны нулю). Если невозможно, докажите это. Собственные значения, собственные векторы и матрица D могут быть комплексными.

$$a. A = \begin{pmatrix} -19 & 25 & -25 \\ 0 & 4 & 0 \\ 9 & -7 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$b. A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 24 & -20 & 24 \\ 24 & -16 & 20 \end{pmatrix}.$$

Задача 2. Как известно, у диагонализируемых матриц 2×2 есть (как минимум) два (линейно независимых) собственных вектора, а у недиагонализируемых (над \mathbb{C}) — только один. Будем непрерывно менять матрицу, так, чтобы она в какой-то момент стала недиагонализируемой. Собственные векторы будут непрерывно меняться вместе с матрицей. Куда денется один собственный вектор, когда матрица станет недиагонализируемой?

Чтобы ответить на этот вопрос, изучим матрицу

$$A(s) = \begin{pmatrix} 4 - 3s & 12s - 8 \\ 1 - s & 4s - 2 \end{pmatrix},$$

зависящую от вещественного параметра s . При каком значении s матрица будет недиагонализируема? Обозначим это значение через s_* . Пусть $u(s) = (u_1(s), u_2(s))$ и $v(s) = (v_1(s), v_2(s))$ —

два собственных вектора матрицы $A(s)$. Обозначим через $\varphi(s) = u_2(s)/u_1(s)$ и $\psi(s) = v_2(s)/v_1(s)$ угловые коэффициенты собственных векторов. Найдите $\lim_{s \rightarrow s_*} \varphi(s)$ и $\lim_{s \rightarrow s_*} \psi(s)$? Как значения этих пределов соотносятся друг с другом? (Если вдруг какие-то из этих пределов оказались равны бесконечности, поменяйте местами первую и вторую компоненты каждого вектора в определениях φ и ψ .) Что вы можете сказать про собственные подпространства оператора $A(s)$? И куда, в конце концов, девается один из собственных векторов, когда матрица перестаёт быть диагонализируемой?!

Задача 3. Оператор \mathcal{A} действует на четырёхмерном векторном пространстве V над полем вещественных чисел. В V задан базис (e_1, e_2, e_3, e_4) . Известно, что подпространства $V_1 = \langle e_1, e_2 \rangle$ и $V_2 = \langle e_3, e_4 \rangle$ являются инвариантными для оператора \mathcal{A} . Ограничение оператора \mathcal{A} на V_1 является поворотом на угол $\frac{\pi}{3}$ против часовой стрелки (от e_1 к e_2). Ограничение оператора \mathcal{A} на V_2 в базисе (e_3, e_4) задаётся матрицей

$$\begin{pmatrix} 9 & 10 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}.$$

- Записать матрицу оператора \mathcal{A} в базисе (e_1, e_2, e_3, e_4) .
- Найти все инвариантные подпространства этого оператора (кроме нулевого и всего V).
- Разложить всё пространство в прямую сумму инвариантных подпространств как можно меньшей размерности.
- Найти базис, в котором матрица оператора \mathcal{A} имеет блочно-диагональную форму с блоками как можно меньшего размера.

Задача 4. Рассмотрим линейный оператор \mathcal{A} , заданный матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} -9 & 45 & -27 \\ 1 & -3 & 0 \\ 6 & -26 & 12 \end{pmatrix}.$$

- Докажите, что оператор \mathcal{A} является нильпотентным.
- Найдите A^2 .
- Найдите любой такой вектор u , что $A^2u \neq 0$.
- Найдите такие векторы v_1, v_2, v_3 , что $Av_1 = 0$, $Av_2 = v_1$ и $Av_3 = v_2$. (Подсказка: в качестве одного из этих векторов можно взять вектор u . В качестве какого?)
- Найдите базис, в котором матрица оператора имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(Подсказка: вы уже это сделали.)