

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019—20 уч. год

Математический анализ — 1

Домашнее задание №3

И. Щуров, В. Болбачан, А. Дунайкин, Д. Леонкин, А. Трофимова, И. Эрлих

Фамилия и имя студента: Аксюткин Андрей Михайлович

## Правила

**Academic ethics policy.** Попытка сдать хотя бы частично списанный текст будет рассматриваться как грубое нарушение принципов академической этики со всеми административными и репутационными последствиями.

**Deadline policy.** Срок сдачи работы указан в му.NES и не будет переноситься. В случае сдачи работы после срока оценка будет определяться по формуле  $x(t) = x_0 e^{-t}$ , где  $x_0$  — оценка без учёта штрафа,  $t$  — количество дней, прошедших с момента дедлайна до момента сдачи работы (вещественное число).

**Typography policy.** Текст работы сдаётся исключительно в формате PDF. Работа с идеальным оформлением, набранная на компьютере, выглядящая как страница из хорошо свёрстанной книги, получает бонус в 5% от числа набранных баллов. Работа с плохим оформлением (например, скан работы, написанной от руки), получает штраф в 5% от числа набранных баллов. Работа, чтение которой вызывает существенные затруднения (неразборчивый скан или фотография и т.д.), может быть возвращена на доработку без продления дедлайна.

## Задачи

**Задача 1.** (10 баллов за каждый пункт) Провести полное исследование функции. Найти её область определения, экстремумы (и значения в экстремумах), промежутки монотонности, асимптоты (вертикальные, горизонтальные, диагональные), точки разрывов. Определить типы разрывов. Во всех пунктах, кроме (с) и (f), найти промежутки выпуклости и точки перегиба. На основе полученной информации построить график функции, отметить на нём точки экстремумов, точки перегиба, асимптоты.

a.  $f(x) = 8x^3 + 12x^2 - 2$ ;

b.  $f(x) = \frac{4x^2 - 8x + 5}{-2x + 2}$ ;

c.  $f(x) = \sin(\ln(4x^2 + 4x + 3))$ ;

d.  $f(x) = 4x^2 - 6x + \ln(-2x + 3)$ ;

e.  $f(x) = e^{-4x^2 - 16x - 16}$ ;

f.  $f(x) = \exp\left(\frac{-2x+1}{-4x^2+4x}\right)$ .

**Задача 2.** (10 + 5 баллов) Рассмотрим функции  $f(x) = \lambda x + \sin(4x)$ , где  $\lambda \in \mathbb{R}$  — некоторый вещественный параметр, и  $g(t) = -3t^5 - 4t^3 - 3t + 3$ . Пусть  $h(x) = g(f(x))$ , областью определения  $h$  являются все вещественные числа.

a. При каких значениях параметра  $\lambda \in \mathbb{R}$  функция  $h$  обратима?

b. Пусть  $\lambda = 6$  и  $h^{-1}(y)$  — обратная функция. Найти значение производной  $(h^{-1}(y))'$  в точке  $y_0 = 3$ .

**Задача 3.** (5 + 10 баллов) Докажите, что у уравнения

$$x^{11} = e^{-x} + 2 \sin\left(\frac{x}{8} - \frac{3}{8}\right)$$

- а. есть корень;
- б. он ровно один.

*Подсказка к пункту (б).* Можно вычесть левую часть из правой и доказать, что производная получившейся функции везде положительна. Для этого нужно внимательно посмотреть, какие слагаемые как можно оценить при различных значениях  $x$ .

**Задача 4.** (10 баллов) Про функцию  $f$  известно, что она определена на отрезке  $[-2, 3]$ , непрерывна на этом отрезке, дифференцируема во всех точках интервала  $(-2, 3)$  и  $f(-2) = 2$ . Также известно, что для всех  $x \in (-2, 3)$

$$f'(x) < 6.$$

Докажите, что

$$f(3) < 32.$$

**Задача 5.** (10 + 5 баллов) Пусть функция  $f$  определена на некотором отрезке  $[a, b]$ , непрерывна на этом отрезке и строго выпукла вверх.

- а. Докажите, что у этой функции существует локальный максимум, причём он единственный и является глобальным максимумом. Производными пользоваться нельзя — не факт, что они существуют.
- б. Справедливо ли утверждение предыдущего пункта, если в условии заменить отрезок  $[a, b]$  на интервал  $(a, b)$ ? Если да, докажите. Если нет, приведите контрпример.

Если вы используете какие-то теоремы из лекций, пожалуйста, ссылайтесь на них явно.