

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019—20 уч. год

Математический анализ — 1

Домашнее задание №5

И. Щуров, В. Болбачан, А. Дунайкин, Д. Леонкин, А. Трофимова, И. Эрлих

Фамилия и имя студента: Закиров Тимур Маратович

Правила

Academic ethics policy. Попытка сдать хотя бы частично списанный текст будет рассматриваться как грубое нарушение принципов академической этики со всеми административными и репутационными последствиями.

Deadline policy. Срок сдачи работы указан в my.NES и не будет переноситься. В случае сдачи работы после срока оценка будет определяться по формуле $x(t) = x_0 e^{-t}$, где x_0 — оценка без учёта штрафа, t — количество дней, прошедших с момента дедлайна до момента сдачи работы (вещественное число).

Typography policy. Текст работы сдаётся исключительно в формате PDF. Работа с идеальным оформлением, набранная на компьютере, выглядящая как страница из хорошо свёрстанной книги, получает бонус в 5% от числа набранных баллов. Работа с плохим оформлением (например, скан работы, написанной от руки), получает штраф в 5% от числа набранных баллов. Работа, чтение которой вызывает существенные затруднения (неразборчивый скан или фотография и т.д.), может быть возвращена на доработку без продления дедлайна.

Задачи

Задача 1. (10 баллов) Найти все значения параметра a , при которых функция

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 14ax + 49a + 4x - 28, & x \leq 7 \\ 7x^2 - 94x + 315, & x > 7 \end{cases}$$

имеет первую производную в точке 7, но не имеет второй.

Задача 2. (20 баллов) Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{|2x+4|}\right), & x \neq -2 \\ 0, & x = -2. \end{cases}$$

Докажите, что эта функция является дифференцируемой в точке -2 сколько угодно раз, найдите все её производные в этой точке и выпишите её ряд Тейлора в этой точке ($x_0 = -2$). Сходится ли ряд Тейлора к функции, то есть верно ли, что для всех x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = f(x),$$

где $T_n(x)$ — многочлен Тейлора степени n ? Почему это не противоречит теореме о формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано? В форме Лагранжа?

Задача 3. (10 баллов за каждый пункт) Найти предел

а.
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{4x^5}{15} - \frac{2x^4}{3} - \frac{4x^3}{3} - 2x^2 - 2x + e^{2x} - 1}{-\frac{81x^5}{8} + \frac{27x^3}{2} + 3x \cos(3x) - 3x};$$

б.
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x + e^{\sin(3x^2+3x)} - 1}{-3x + \sin(3x + \sin(4x^2))}.$$

Задача 4. (10 баллов) Про функцию f известно, что она дважды дифференцируема для $x \geq 0$, $f(0) = -4$ и $f'(0) = 2$ и $f''(x) > 8$ для всех $x \geq 0$. Докажите, что для всех $x > 0$, $f(x) > 4x^2 + 2x - 4$.

Задача 5. (10 баллов) Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sin(\sqrt[3]{5x}) - \sqrt[3]{5x}.$$

Дифференцируема ли она в точке $x = 0$? Если да, найти её производную в этой точке.