

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 2019—20 уч. год

Математический анализ — 1

Домашнее задание №6

Фамилия и имя студента: Потапов Глеб Николаевич

Правила

Academic ethics policy. Попытка сдать хотя бы частично списанный текст будет рассматриваться как грубое нарушение принципов академической этики со всеми административными и репутационными последствиями.

Deadline policy. Срок сдачи работы указан в my.NES и не будет переноситься. Работа после срока не принимается.

Typography policy. Текст работы сдаётся исключительно в формате PDF. Работа с идеальным оформлением, набранная на компьютере, выглядящая как страница из хорошо свёрстанной книги, получает бонус в 5% от числа набранных баллов. Работа с плохим оформлением (например, фотография работы, написанной от руки), получает штраф в 5% от числа набранных баллов. Работа, чтение которой вызывает существенные затруднения (неразборчивый скан или фотография и т.д.), может быть возвращена на доработку без продления дедлайна.

Задачи

Задача 1. (10 баллов за каждый пункт) Исследовать интеграл. Если он собственный, найти его. Если несобственный, исследовать сходимость. Если сходится, найти его, если расходится — доказать, что расходится.

a. $\int_0^3 \frac{1}{x^2 - 6x + 5} dx$

b. $\int_0^\infty \frac{x}{(x^2 + 2)^2} dx$

c. $\int_4^9 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx$

d. $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{2x + 1}} dx$

e. $\int_{\frac{\sqrt{2}\sqrt{\pi}}{2}}^{\sqrt{\pi}} x^3 \cos(x^2) dx$

f. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2 \sin(x)}{x^6 + 1} dx$

g. $\int_0^\pi x^3 \cos(x) dx$

h.
$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 3} dx$$

i.
$$\int_0^1 x^2 (2x^3 + 1)^5 dx$$

Задача 2. (15 баллов) Доказать, что

$$9 \leq \int_2^5 \sqrt{x^3 + 1} dx \leq \frac{621}{4}$$

Задача 3. (5+15 баллов) Функция $\Phi(x)$ определяется следующим образом:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx.$$

Выразить следующие интегралы через Φ :

а.

$$\int_{-3}^{-2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} dx.$$

б.

$$\int_2^5 \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x+2)^2}{8}} dx.$$

(Сейчас выглядит страшновато, но на теореме пригодится. Вам нужно понять, как связаны графики подынтегральных выражений и соответствующие площади.)

Задача 4. (20 баллов) Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ и в некоторой точке $c \in (a, b)$, $f(c) = 0$ и существует производная $f'(c)$. Предположим также, что в некоторой окрестности c нет других корней f . Докажите, что интеграл

$$\int_a^b \frac{dx}{f(x)}$$

расходится.